



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

คู่มือ

การใช้ยาแผนไทย

ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กี่ปรึกษา :

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ชวัญชัย วิศิษฐานนท์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ธิติ แสงธรรมรรມ

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์จักราชรุ เพื่อคง

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

ดร.รัชนี จันทร์เกษ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ISBN : 978-616-11-4758-7

จัดทำโดย : ศูนย์จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : กันยายน ๒๕๖๔

จำนวนพิมพ์ : ๕๐,๐๐๐ เล่ม

พิมพ์โดย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลักษณ์ ๒๕๐๕



๒

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำนำ

ตามที่เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่มีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อและมีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพิ่มมากขึ้น และด้วยนโยบายของรัฐบาลให้มีมาตรการในการรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีปริมาณมากโดยให้มีการรักษาดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตระหนักรถึงความสำคัญในการให้ความรู้เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร เช่น การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรสำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อย และการใช้ตาร์บยาไทยอีกหลายตาร์บที่มีข้อบ่งใช้ และสรรพคุณในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนตามอาการ เช่น ยาห้าราก ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง และยาหอมนว哥ฐุที่ได้มีการนำมาใช้ดูแลสำหรับผู้ป่วยตามอาการของการเกิดโรค ซึ่งเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและชุมชนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คณะผู้จัดทำ
กันยายน ๒๕๖๔





กรมการแพทย์พื้นบ้านและยาสมุนไพร
Department of The Traditional and Alternative Medicine

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การรักษาโควิด-19 ด้วยยาแผนไทย	๕
แนวทาง TTM for HI CI	๘
ยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ	
ยาห้าราก	๑๑
ยาจันทน์ลีลา	๑๓
ยาประสะจันทน์แดง	๑๕
ยาหอมนวโกฐี	๑๗
ยาตรีผลา	๑๙
ยาเขียวหอม	๒๐
ยาราชตุบรรจง	๒๒
ยามันธราตุ	๒๔
ยาปราบชมพูทวีป	๒๖
ยาออมแก้วโอมมะเร็ง	๒๘
ยาแก้วโอมสมมะขามป้อม	๒๙
ยาฟ้าทะลายโจร	๓๑
ยาขิง	๓๕
อ้างอิง	



๕

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรักษาโรคโควิด-19 ด้วยยาแผนไทย

เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงไม่ได้มียาเฉพาะที่จะใช้สำหรับรักษาโรคนี้ แต่ด้วยความรุนแรงของโรคที่ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อображенามีอาการแทรกซ้อนแล้วเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ต้องเร่งรีบหายาเพื่อจะใช้ในการรักษาอย่างเร่งด่วน การค้นคว้าหรือวิจัยตัวยาใหม่ที่รักษาเฉพาะโรคย่อมไม่ทันต่อการใช้ในภาวะการณ์ชั่วคราวนี้ จึงทำให้จำเป็นต้องมองหายาที่มีอยู่เดิมที่เคยใช้ได้ผลดีในการรักษาโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายคลึงกันมาใช้ในการรักษาการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการเร่งด่วน การที่เลือกยาที่ได้เคยใช้รักษาได้ผลในโรคหนึ่งมารักษาด้วยวัตถุประสงค์ในการรักษาอีกโรคหนึ่งอย่างน้อยก็จะบอกได้ว่าyanนั้นเป็นยาที่เคยใช้ได้อย่างปลอดภัยมาก่อน แม้ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าyanนั้นจะใช้ในการรักษาโรคใหม่ได้ผลดีหรือไม่ ผลลัพธ์ในการรักษาจึงเป็นสิ่งที่ยังต้องนำมาค้นคว้าวิจัยต่อไป

พระคัมภีร์ตักศิลาได้บันทึกอาการของโรคและลำดับของการรักษาโรคเอาไว้โดยเริ่มต้นจาก ๑. การกระหุงพิษเข้าคือการทำให้อาการไข้หรือว่าพิษความร้อนในร่างกายลดลงและถูกขับออก ๒. การแปรไข้คือการรักษาอาการไข้ไม่ให้ส่งผลกระทบไปจนมีอาการอื่นตามมา ๓. การครอบไข้คือการสมดุลร่างกายและปรับภูมิต้านทานเพื่อรักษาอาการที่ยังมีตอกด้างหลังจากที่ไม่มีไข้ ยาแผนไทยที่มีการบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ตักศิลาและที่เคยใช้รักษาโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายกันอยู่ก่อนแล้วจึงได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการและผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย รวมทั้งผู้ที่มีอาการหลังการติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างปลอดภัย



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ส่งเสริมให้แพทย์แผนไทย
ได้ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเชื้อโควิด-19
ใน ๓ กลุ่ม คือ

๑. กลุ่มก่อนการติดเชื้อ เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ^๑
การทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงจะทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น
จึงทำให้ความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดลดลง

๒. กลุ่มผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง เป็นผู้ที่ตรวจพบ
ว่ามีการติดเชื้อแต่ว่ายังไม่มีอาการ หรือผู้ที่ติดเชื้อแล้วแต่ไม่มีอาการเล็กน้อย อาทิ เช่น
ครั้นเนื้อรั้นตัว สะบัดร้อน สะบัดหนาว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ คัดจมูก
มีน้ำมูก ไอแห้ง ไอมีเสมหะ ปวดศีรษะ จมูกแห้ง น้ำมูกแห้ง ปากเบรี้ยว ปากขม
กินข้าวไม่ได้ ห้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน การให้ยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยเหลือไวรัสหรือ
ยับยั้งการขยายตัวของไวรัส รวมทั้งยาสมุนไพรที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ให้แข็งแรง
จะทำให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น จึงทำให้ไม่มีอาการลุกຄามหรือว่ามีภาวะ
แทรกซ้อนที่รุนแรง อีกทั้งการให้ยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการควบคุมปฏิกิริยาของ
ร่างกายที่ทำให้เกิดการอักเสบที่รุนแรงมากเกินไปก็จะทำให้ป้องกันอาการที่ลุกຄาม
จนเกิดปอดอักเสบได้




๓. กลุ่มหลังการติดเชื้อ เป็นผู้ที่หายจากอาการของโควิด-19 แล้ว แต่ยังมีอาการบางอย่างหลังการเป็นโควิด-19 อญู (Post COVID syndrome) เช่น ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนล้า หายใจลำบาก หายใจดีนั้นไม่เต็มอิ่ม ไอเรื้อรัง รู้สึกครั้นเนื้อครั้นตัวแต่ว่าไม่มีไข้ตัวร้อน ห้องเสีย ห้องอึด บางครั้งอาการเหล่านี้ยังคงเป็นอยู่อีกนานหลังจากหายจากอาการโควิดแล้ว (Long COVID syndrome) การให้ยาสมุนไพรหลังหายจากอาการโควิด-19 แล้ว เพื่อบรเทาอาการที่ตามมา ปรับสมดุลร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นการปรับภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง จะทำให้ร่างกายฟื้นคืนตัวได้ดีและเร็วขึ้น และทำให้ไม่มีอาการเรื้อรังตามมา

การรักษาทางการแพทย์แผนไทยจึงต้องมีการพิจารณาเป็นระยะ เพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ติดเชื้อแต่ละรายที่มีอาการและความรุนแรงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้ติดเชื้อทุกราย จึงต้องเข้าสู่ระบบการรักษาทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมโรค การใช้ยาแผนไทย จึงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา และ/หรือการนำไปใช้ร่วมรักษา กับการแพทย์แผนปัจจุบันในระบบ





กรมการแพทย์แผนไทยและแผนการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine





ยาสมุนไพร ในบ้านเชียงใหม่แห่งชาติ



กรมการแพทย์民族医药和传统医药司
Department of Traditional and Alternative Medicine

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ใช้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ

- ยาห้าราช
- ยาจันทน์สีเลา
- ยาประสะจันทน์แดง
- ยาหอยนวไกซ์
- ยาตรีพลา
- ยาธาตุบรรจุ
- ยามันกระตุ
- ยาปราบชนพูกวีป
- ยาอมแก้ไออะเวঁง
- ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม

ยาพัฒนาจากสมุนไพร

- ยาฟ้าทะลายโจร
- ยาพัง



๙๐

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยาห้าราก



คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๖๖



สูตรคำรับ ในผงยา ๑๐๐ กรัม ประกอบด้วย รากย่านาง, รากคนทา, รากมะเดื่อชุมพร, รากซิงชี่ รากไม้เท้ายายม่อม หนักสิ่งละ ๒๐ กรัม

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไข้

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ – ๑.๕ กรัม ละลายน้ำสุก วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม ละลายน้ำสุก วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

ชนิดเบ็ด และชนิดแคปซูล


ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ – ๑.๕ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

- ข้อควรระวัง**
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
 - ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ทับกระดูกหรือไข้ระหว่างมีประจำเดือน



ชาจักษุสีเขียว



สูตรคำรับ

ในผงยา ๕๙ กรัม ประกอบด้วย

โกรก สอ โกรกเขมา โกรกจุพลามพา แก่นจันทน์ขาว หรือจันทน์ชะมด
แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม เกาบอะระเพ็ด รากปลาไหลฟือก
หนักสิ่ง ๑๖ กรัม พิมเสน หนัก ๓ กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม ละลายน้ำสุก ทุก ๓ - ๔
ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม
ละลายน้ำสุก ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ชนิดเนื้ด และชนิดแคปซูล

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง
เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม - ๑ กรัม
ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง


- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สังสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจ
บดบังอาการของไข้เลือดออก
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น
ควรปรึกษาแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนะนำให้ใช้ยาจันทน์ลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ทับกระดูกหรือไข้ระหว่าง
มีประจำเดือน



ยาประสะจันทน์แดง



สูตรตำรับ

ใบแพงยา ๖๔ กรัม ประกอบด้วย

๑. แก่นจันทน์แดง หนัก ๓๒ กรัม
๒. รากเหมือนดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว หัวเปราะห้อม โภชหัวบัว แก่นจันทน์เทศ แก่นฝางเสน หนักสิ่งละ ๔ กรัม
๓. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ ๑ กรัม



ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำกระสายยา
ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา
ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง น้ำกระสายที่ใช้ใช้น้ำสุก หรือ
น้ำดอกระมะลิ

ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม
ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ลักษณะของเกสรดอกไม้
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจาก
อาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
- กรณีบรรเทาอาการไข้ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลา
นานเกิน ๓ วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์



๑๖

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยาห่อหัวกฐ



สูตรตำรับยา ในพงยา ๒๑๒ กรัม ประกอบด้วย

โกรธสือ โกรธเขมา โกรธหัวบัว โกรธเขียง โกรธจุพาลัมพา โกรธกระดูก โกรธก้านพร้าว
โกรธพุงปลา โกรธขามังสี หนักสิ่งละ ๔ กรัม เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว
เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแตen เทียนเยาวพาณิ เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย
เทียนตากบ หนักสิ่งละ ๔ กรัม เปลือกสมุลแวง หญ้าตีนนก รากแฟกหอม
เปลือกชาลูด หัวประะหอม กระลำพัก ขอนดอก เนื้อไม้กฤษณา หนักสิ่งละ ๔ กรัม
เหงჯิขิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสารค้าน รากช้าพลู หนักสิ่งละ ๓ กรัม
หัวเหว่หมู ลูกกระวน ดอกก้านพลู ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ เปลือกอบเชยญวน
ลูกผักซีลา แก่นสน หนักสิ่งละ ๔ กรัม แก่นสักชี้ ลูกราชตัด ลูกสารพัดพิษ
แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระ-dom เถาบอระเพ็ด หนักสิ่งละ ๔ กรัม
เกรสรบวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ ๔ กรัม
เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิภาค รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ ๔ กรัม พิมเสน
หนัก ๑ กรัม



ข้อบ่งใช้

๑. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก)
ในผู้สูงอายุ
๒. แก้ลมปลายไข้ (หลังจากพื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน
วิงเวียน เปื้ออาหาร ห้องอีด และอ่อนเพลีย)

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง

รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม ละลายน้ำกระสาย เมื่อมีอาการ
ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง

น้ำกระสายยาที่ใช้

- กรณีแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก)
ในผู้สูงอายุ ใช้น้ำลูกผักชี (๑๕ กรัม) หรือเทียนคำ (๑๕ กรัม)
ต้มเป็นน้ำกระสายยา
- กรณีแก้ลมปลายไข้ (หลังจากพื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น
คลื่นเหียน วิงเวียน เปื้ออาหาร ห้องอีด อ่อนเพลีย) ใช้ก้านสะเดา
(๓๓ ก้าน หรือ ๑๕ กรัม) ลูกกระดอม (๗ ลูก หรือ ๑๕ กรัม)
และถางอะระเพ็ด (๗ องคุลีหรือ ๑๕ กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา
- ถ้าหากน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน

ชนิดเม็ด

รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม ทุก ๓ - ๔ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ไม่ควรเกินวันละ ๓ ครั้ง

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง

ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิม
(anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
(antiplatelets)



ชาตรีผลลั่



สูตรตำรับ ในผงยา ๙๐ กรัม ประกอบด้วย เนื้อลูกสมอไทย, เนื้อลูกสมอพิเกก,
เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ ๓๐ กรัม

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้ ชบิดซง

รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ ๑๒๐ - ๒๐๐ มิลลิลิตร ทิ้งไว้ ๓ - ๕ นาที ดื่มในขณะยังอุ่น เมื่อมีอาการไอ ทุก ๔ ชั่วโมง

ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอง และชนิดแคปซูล

รับประทานครั้งละ ๓๐๐ - ๖๐๐ มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ ๓ - ๕ ครั้ง

อาการไม่พึงประสงค์ ท้องเสีย





กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of The Traditional and Alternative Medicine

ยาเขี้ยวหอม



สูตรตำรับ

ในผงยา ๙๐ กรัม ประกอบด้วย ใบพิมเสน ใบผักกระโน้ม
ใบหมากผู้้หมากเมีย ใบสันพร้าหอม รากแฟกหอม หัวเปราะหอม
แก่นจันทน์เทศหรือแก่นจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบarend
ว่านร่อนทอง เนระพุสี พิษนาศน์ มหาสต้ำ ดอกพิกุล ดอกกบุนนาค
ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ ๕ กรัม



๒๐

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ

แก้พิษหัด พิษอีสุกอีส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและอีสุกอีส)

ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำกระสายยาทุก ๔ – ๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๑ – ๑๒ ปี ครั้งละ ๕๐ มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยาทุก ๔ – ๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาที่ใช้

กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ ใช้น้ำสุก หรือน้ำดอกมะลิ เป็นน้ำกระสายยา

กรณีแก้พิษหัด พิษอีสุกอีส ละลายน้ำรากผักชีต้ม เป็นน้ำกระสายยาทึบ รับประทาน และชโลม

หมายเหตุ การชโลมใช้ยาแดงละลายน้ำ ๑ ต่อ ๓ แล้วชโลม (ประพร) ทั่วตามตัวบริเวณที่ตุ่มเสยังไม่แตก

ชนิดเบ็ด

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๑ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐ มิลลิกรัม ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ลักษณะของยาต่อไม้
 - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น
- ควรปรึกษาแพทย์






กรมการแพทย์民族及传统医药司
Department of The Traditional and Alternative Medicine



ชาชาตุบรรจบ



สูตรตำรับ

ในผงยา ๑๐๔ กรัม ประกอบด้วย เนื้อลูกสมอไทย ๑๖ กรัม โกรกุก้านพร้าว ๘ กรัม เหง้าขิง ๔ กรัม โกรกุเขมา ๔ กรัม โกรกุพุงปลา ๔ กรัม โกรกุเชียง ๔ กรัม โกรกุสอง ๔ กรัม เทียนดำ ๔ กรัม เทียนขาว ๔ กรัม เทียนสัตตบุญ ๔ กรัม เทียนเยาวพาณี ๔ กรัม เทียนแดง ๔ กรัม ลูกจันทน์ ๔ กรัม ดอกจันทน์ ๔ กรัม ดอกกานพลู ๔ กรัม เปลือกสมุลแวง ๔ กรัม ลูกกระวน ๔ กรัม ลูกผักชีลา ๔ กรัม ใบพิมเสนตัน ๔ กรัม ดอกดีปลี ๔ กรัม หัวประหลอม ๔ กรัม การบูร ๔ กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ



๒๒

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดของ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาที่ใช้

- กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ห้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้เปลือกแคนหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกถุงทับทิมต้ม แหกรักบันน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสายยา
- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน

ชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอน

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนนอน เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

คำเตือน

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของสารบูรและเกิดพิษได้
- ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน ๑ วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์



ยามั่นทราตุ



สูตรตำรับ

ในผงยา ๙๓ กรัม ประกอบด้วย

๑. เหง้าขิง ลูกเบญจกานี หนักสิ่งละ ๙ กรัม
๒. โกรธุสอ โกรธุเขมา โกรธุหัวบัว โกรธุเชียง โกรธุจพาลัมพา เทียนดำ
เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแต่น
ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา หัวกระเทียม เปลือกสมุลแวง
เปลือกโมกมัน แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ดอกกานพลู
ดอกดีปลี รากชาพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง
พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ การบูร หนักสิ่งละ ๓ กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ร้าตไม่ปกติ



ขนาดและวิธีใช้

ชนิดของยา

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม ละลาย

น้ำสุก วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ ๑ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร

เด็ก อายุ ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ

๓ ครั้ง ก่อนนอน

ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ขวบ เนื่องจากเป็นยาสร้อนทำให้ลิ้น ปากและร้อนได้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้

คำเตือน

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของ การบูรและเกิดพิษได้



ยาปรับชมพูทอับ



สูตรตำรับ

ในผงยา ๔๖๕ กรัม ประกอบด้วย

๑. เหือกปลาหม้อ (หั้งตัน) พริกไทยดำ ใบกัญชาเทศ หนักสิ่งละ ๑๒๐ กรัม
๒. หัศคุณเทศ ดอกกานพลู หนักสิ่งละ ๑๐ กรัม หัวบุกรอเนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าจิง หนักสิ่งละ ๘ กรัม
๓. เทียนแดง เทียนตาตึกแทน เทียนแกลบ หนักสิ่งละ ๖ กรัม เทียนดำ โกรธสอ โกรธเขมา ลูกพิลังกาสา ลำพันทางหมู หนักสิ่งละ ๕ กรัม
๔. ดอกดีปลี การบูร หนักสิ่งละ ๒ กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวน หนักสิ่งละ ๑ กรัม



ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการที่เกิดจากการแพ้อากาศ

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ ๗๕๐ มิลลิกรัม - ๑.๕ กรัม วันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้มีอพบรากช์ช้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไชนัสอักษะ สีน้ำเงิน การติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอาการเจ็บบริเวณไชนัส ไข้สูง น้ำมูกและเสมหะ夷ิว เป็นต้น
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ เด็ก

คำเตือน

- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแมลงปีoyerเพปติก และโรคกระดูกย้อน เนื่องจากเป็นตัวรับยา
- ควรระวังการใช้ยาเกินขนาดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไตหรือทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากอาจเกิดพิษจากการบูร
- ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากทำรับนี้มีพิษไทยในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์

แสดงร้อยยอดอก



ยาออมมะเว้ง



- สูตรตำรับ** ลูกมะเว้งตัน, ลูกมะเว้งเครือ, รากมะเว้งตัน, รากมะเว้งเครือ และตัวยาอื่น ๆ
- ข้อบ่งใช้** บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
- ขนาดและวิธีใช้** ผู้ใหญ่ อมครั้งละ ๓ - ๕ เม็ด เมื่อมีอาการไอ ทุก ๔ ชั่วโมง เด็ก อมครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด เมื่อมีอาการไอ ทุก ๔ ชั่วโมง
- ข้อควรระวัง** ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย
- อาการไม่พึงประสงค์** ท้องเสีย





กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Traditional and Alternative Medicine

ชาแก้ไข้ ผสมหมาดปีอก



สูตรคำรับกี่๑

ในยา ๑๐๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วยสารสกัดน้ำมะขามป้อม เท่าๆกัน ๔๐ % ๖๐ มิลลิลิตร สารสกัดใบเสนียด ๑๐ มิลลิลิตร กลีเซอรีน ๕ มิลลิลิตร เกลือแกง ๐.๕ มิลลิลิตร สารสกัด ราช竹เยอเมทีส ๐.๔๕ มิลลิลิตร แอลกอฮอล์ ๙๕ % ๐.๐๕ มิลลิลิตร เกลือดshedding ๐.๐๑ มิลลิกรัม



สูตรตำรับก๊ ๒

ในยา ๑๐๐ มิลลิลิตร ประกอบด้วย
สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น ๒๕ % ๓๐ มิลลิลิตร
มะนาวลดองแห้ง ๘ มิลลิกรัม สารสกัดรากชาเขียวเทศ
๕ มิลลิลิตร ผิวส้มจีน ๓.๓ มิลลิกรัม บัวย ๓ มิลลิกรัม
เนื้อลูกสมอพิเกก ๓ มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอไทย ๑ มิลลิกรัม
หล่อหั้งกี้วย ๒ มิลลิกรัม เกล็ดสะระแหน่ ๐.๐๘ มิลลิกรัม
น้ำตาลทรายแดง ๔๐ มิลลิกรัม

ข้อบ่งใช้

ขนาดและวิธีใช้

ข้อห้ามใช้

ข้อควรระวัง

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก ๕ ชั่วโมง

ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องเสีย力气 เนื่องจากมะขามป้อม
มีฤทธิ์เป็นยาрабาย





ยาพืช: ลายจرس



คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๓๙



(๙) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน

ตัวยาสำคัญ ผงจากส่วน嫩อ่อนดินของฟ้าทะลายโจร [*Andrographis paniculata* (Burm. f.) Wall. ex Nees] ที่มีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณ เป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖.๐ โดยน้ำหนัก (w/w) และปริมาณ andrographolide ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑.๐ โดยน้ำหนัก (w/w)

ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้

๑. บรรเทาอาการโรคหวัด เจ็บคอ

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๑.๕ – ๓ กรัม วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

๒. บรรเทาอาการก้อนเสียบเนิดก์ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระ ไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ ๕๐๐ มิลลิกรัม – ๒ กรัม วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

๓. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด ๑๙ ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรค ที่รุนแรง

ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide ๑๘๐ มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร รับประทานติดต่อกันไม่เกิน ๕ วัน



(๒) ยาสารสกัดผงพ้ากะลาຍโจจ ยาแคปซูล ยาเม็ด խนาดلاءວอีไซ

๑. บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้

խนาดلاءວอีไซ รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide ๖๐ - ๑๒๐ มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร

๒. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรค ที่รุนแรง

խนาดلاءວอีไซ

ผู้ใหญ่ รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide ๑๔๐ มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร รับประทานติดต่อกันไม่เกิน ๕ วัน

ผู้ป่วยเด็ก ไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับขนาดยา ที่จะแนะนำให้ใช้ใน ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งยามีลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุ ผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก

เด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด ๓ - ๓.๕ มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วันละ ๓ - ๔ ครั้ง
เด็กโตกับน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป ให้ใช้ขนาดยาเท่าผู้ใหญ่



ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดثارก วิรูปได้
- ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรแก้เจ็บคอในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคอ เนื่องจากติดเชื้อ

Streptococcus group A ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบเนื่องจากเคย ติดเชื้อ Streptococcus group A และมีประวัติโรคหัวใจรูห์มานิตค

- ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง และหนาวสั่น

ข้อควรระวัง

- หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขาไม้อกชาหรืออ่อนแรง
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน ๓ วัน แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้น ระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิม (anticoagulants) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระวนการเมแทบอลิซึม ผ่าน CYP ๔๕๐
- อาการไม่พึงประสงค์ อาจทำให้มีอาการปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เปื้ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ลมพิษ



ยาจิง



ตัวยาสำคัญ ผงเหง้าขิง (*Zingiber officinale* Roscoe.) ที่มีน้ำมันหอมระ夷
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)

ข้อบ่งใช้

๑. บรรเทาอาการท้องอืด แน่นจุกเสียด
๒. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน จากการเมารถ เมารถ
๓. ป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน หลังการผ่าตัด

ขนาดและวิธีใช้

- บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด รับประทาน
วันละ ๒ – ๔ กรัม
- ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถ
เมารถ รับประทานวันละ ๑ – ๒ กรัม ก่อนเดินทาง ๓๐ นาที
- ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
- ป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน หลังการผ่าตัด รับประทาน
ครึ่งละ ๑ กรัม ก่อนการผ่าตัด ๑ ชั่วโมง

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดียกเว้นภายใต้
การดูแลของแพทย์
- ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ขวบ

อาการไม่พึงประสงค์

อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณ
ปากและคอ





เอกสารอ้างอิง

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





เอกสารอ้างอิง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราฟีแลร์” ในผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อ “การรักษาโควิด-19”. บริษัท บียอนด์ พับลิสชิป จำกัด. กรุงเทพ. ๒๕๖๔.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. บทบาทของสมุนไพรและยาแผนไทยในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลักษณ์ ๒๕๐๕. ปทุมธานี. ๒๕๖๔.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. คำแนะนำการใช้ตำรับยาไทยยาห้ารากและยาขาว สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19). ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริลักษณ์ ๒๕๐๕. กรุงเทพ. ๒๕๖๔.

บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อินเตอร์เน็ต). เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๔. เข้าถึงได้จาก <http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/drug/text/drug.php?drugID=56&sgID=10>

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔. (อินเตอร์เน็ต). เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๔. เข้าถึงได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF



๓๘

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔. (อินเตอร์เน็ต). เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๔.
เข้าถึงได้จาก <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/072/57.PDF>

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ และโรงเรียนอายุรเวทสำราญสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์, ๒๕๕๕.

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ ตำรายาศิลาเจริญในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้เจริญไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ฉบับสมบูรณ์ ๒๕๐๕. หน้า ๖๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข. พจนานุกรม ศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สำนักงานพุทธศาสนา
แห่งชาติ.





กรมการแพทย์民族及传统医药部
Department of The Traditional and Alternative Medicine



๕๐

คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)