



ข้อมูลรายการอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ประเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฉบับ พ.ศ. 2566

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอยอดแจ้ง

คำนิยาม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบทบาทหน้าที่พัฒนาวิชาการและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมไปถึงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยไทยให้มีความพร้อมสำหรับนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

รายการตำรับยาอ้างอิงสำหรับจดแจ้งนี้เป็นตำรับยาที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดทำขึ้นสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจใช้อ้างอิงเพื่อขอใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งใช้ระยะเวลารอใบอนุญาตประมาณ 1 เดือน เป็นช่องทางที่มีความรวดเร็วกว่าการขึ้นทะเบียนตำรับยา ในการคัดเลือกตำรับยาได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกที่อ้างอิงจากหลักวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย วิธีการควบคุมคุณภาพ และโรคที่เป็นปัญหาของระบบสาธารณสุข ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด และตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขไทย

แม้หนังสือนี้จะมีความคล้ายกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2566 แต่เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร์และการควบคุมคุณภาพของตำรับยาและวัตถุดิบที่ใช้ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับความสามารถในการผลิตและนักวิชาการที่ต้องการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสมุนไพรไทย อย่างไรก็ตามหลักวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในภายภาคหน้าหนังสือเล่มนี้อาจจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับอ้างอิงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะต้องติดตามและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นกรมที่พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง



(นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คำนิยม

ผมได้เห็นพัฒนาการของการทำรายการตำรับยาอ้างอิงสำหรับจดแจ้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน การทำงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการคือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่สนับสนุนให้มีตำรับยาแผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในท้องตลาด ให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้อย่างปลอดภัย เป็นที่น่ายินดีที่การทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานประสบความสำเร็จ มีตำรับยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยที่ประกาศใช้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง และผลนี้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปผลิตและขอรับใบอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว เป็นการส่งเสริมยาแผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างดี และนำไปใช้ได้จริง

ในหนังสือนี้มีองค์ประกอบเด่นคือได้รวบรวมข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพของตำรับยาและวัตถุดิบที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการได้นำไปใช้ หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศให้มีการควบคุมคุณภาพตำรับยาและวัตถุดิบ และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่นักวิชาการสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้อีกด้วย

หนังสือนี้มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ได้มีส่วนร่วมในงานและทำให้หนังสือได้สำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี ผมจึงขอขอบคุณครูบาอาจารย์มา ณ ที่นี้ด้วย



(นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์)

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คำนำ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การสนับสนุนข้อมูลวิชาการประกอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งได้เปิดช่องทางการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 แบบ คือ การจดแจ้ง การแจ้งรายละเอียด และการขึ้นทะเบียน โดยการอนุญาตแบบจดแจ้งนั้น เป็นการอนุญาตทะเบียนแบบใหม่ ซึ่งอาศัยการส่งเสริมจากภาครัฐ ในการคัดเลือกสูตรตำรับยาที่อยู่ในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และนำมาจัดทำข้อมูลสำหรับการอนุญาตทะเบียนสำเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง รวมไปถึงการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างเหมาะสม

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 และได้เพิ่มเติมข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์สมุนไพร ข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพ ของข้อมูลรายการอ้างอิงตำรับยาแผนไทยทั้งสิ้น 50 ตำรับ 90 มอโนกราฟ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 19 ตำรับ 45 มอโนกราฟ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป

ด้วยเหตุผลและความสำคัญของหนังสือข้อมูลรายการอ้างอิงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเภท ตำรับยาแผนไทย และประเภท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฉบับ พ.ศ. 2566 สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง ได้จัดทำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเผยแพร่ใช้ประโยชน์ตามยุคสมัย ปัจจุบัน การอ้างอิงทางวิชาการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และประชาชนทั่วไป

นายสมศักดิ์ กริชชัย

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต
2. นายสมศักดิ์ กริชชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง

1. นางสาวพิศพรรณ วีระยิ่งยง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. นางสาวชวีศา ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. นางสาวภัทธีรา แรงกล้า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. นางสาวกรรวี กรวิศิษฐ์วาทีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5. นางสาวรุ่งทิพย์ เลาะวิถึ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
6. นางสาวเกษราภรณ์ วงษ์พิมพ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



สารบัญ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยปรับสมดุลธาตุ บำรุงร่างกาย

(1) ตรีผลา ชนิดผง	1
(2) ตรีผลา ชนิดแคปซูล	3
(3) ตรีผลา ชนิดต้ม	5
(4) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดผง	7
(5) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล	9
(6) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดต้ม	10
(7) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิตตะสมุฏฐาน ชนิดผง	13
(8) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิตตะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล	14
(9) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิตตะสมุฏฐาน ชนิดต้ม	16
(10) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดผง	18
(11) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล	20
(12) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดต้ม	22
(13) ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดผง	24
(14) ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล	25
(15) ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดต้ม	27
(16) ตรีกาลพิช ชนิดผง	29
(17) ตรีกาลพิช ชนิดแคปซูล	31
(18) ตรีกาลพิช ชนิดต้ม	33
(19) ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 1 ชนิดลูกกลอน	35
(20) ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 2 ชนิดลูกกลอน	37
(21) ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 3 ชนิดผง	39

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยระบบทางเดินอาหาร

(1) ตรีภูก ชนิดผง	41
(2) ตรีภูก ชนิดแคปซูล	43
(3) ตรีภูก ชนิดต้ม	45
(4) ตรีสันนิบาตผล ชนิดผง	47





(5) ตรีสันนิบาตผล ชนิดแคปซูล.....	49
(6) ตรีสันนิบาตผล ชนิดต้ม	51
(7) ตรีพิษจักร ชนิดผง.....	53
(8) ตรีพิษจักร ชนิดแคปซูล	55
(9) ตรีพิษจักร ชนิดต้ม	57
(10) ตรีสมอ ชนิดผง.....	59
(11) ตรีสมอ ชนิดแคปซูล.....	61
(12) ตรีสมอ ชนิดต้ม.....	62
(13) ตรีสัตตกุลา ชนิดผง	65
(14) ตรีสัตตกุลา ชนิดแคปซูล	67
(15) ตรีสัตตกุลา ชนิดต้ม	68
(16) ตรีคันธวาท ชนิดผง	71
(17) ตรีคันธวาท ชนิดแคปซูล.....	73
(18) ตรีคันธวาท ชนิดต้ม.....	74
(19) จตุผลาธิกะ ชนิดผง	77
(20) จตุผลาธิกะ ชนิดแคปซูล	79
(21) จตุผลาธิกะ ชนิดต้ม.....	81

3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส

(1) เกสรทั้ง 5 ชนิดขง	83
(2) เกสรทั้ง 7 ชนิดขง	85
(3) เกสรทั้ง 9 ชนิดขง	87

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง.....	90
--	----





ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยปรับสมดุลธาตุ บำรุงร่างกาย

(1) ตรีผลา ชนิดผง

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดผง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
- บรรจุผงสมุนไพรลงบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ





7. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์: Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้า 443.
2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (2563, 29 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 254 ง. หน้า 3. (ภาคผนวก 4 บัญชียาจากสมุนไพร)



**(2) ตรีผลา ชนิดแคปซูล**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลา ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
- 2) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

7. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์: Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้า 443.
2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (2563, 29 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 254 ง. หน้า 3. (ภาคผนวก 4 บัญชียาจากสมุนไพร)



**(3) ตริผลลา ชนิดต้ม**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริผลลา ชนิดต้ม
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
- ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ

7. ขนาดและวิธีใช้**7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม**

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 1,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก 30 นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร





7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ต้มขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร, พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2375 ฉบับสมบูรณ์, 2505. หน้า 443.
2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 (2563, 29 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 137 ตอนพิเศษ 254 ง. หน้า 3. (ภาคผนวก 4 บัญชียาจากสมุนไพร)



**(4) มหาพิภักัดตรีผลาสำหรับกอบเสมหะสมุนไพร ชนิดผง**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิภักัดตรีผลาสำหรับกอบเสมหะสมุนไพร ชนิดผง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	45 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
 - บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ
- ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่
- ข้อห้ามใช้
ไม่มี
- คำเตือน
ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียบ่อย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.



**(5) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	45 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 80-100
 - บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ
- ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
- ข้อห้ามใช้
ไม่มี
- คำเตือน
ไม่มี
- ข้อควรระวัง
 - ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย





2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.

(6) มหาพิกัตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดต้ม

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตรีผลาสำหรับกองเสมหะสมุฏฐาน ชนิดต้ม

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	45 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	45 กรัม
3	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ ช่วยให้ชุ่มคอ

7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 1,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก 30 นาที ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี





10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียบ่อย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.



**(7) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมุฏฐาน ชนิดผง**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมุฏฐาน ชนิดผง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	45 กรัม
2	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตร แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
 - บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร
- ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่
- ข้อห้ามใช้
ไม่มี
- คำเตือน
ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
2	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.

(8) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดแคปซูล

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	45 กรัม





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
2	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

7. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียบ่อย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ





13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
2	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.

(9) มหาพิกัตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดต้ม

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตรีผลาสำหรับกองปิดตะสมภูฐาน ชนิดต้ม

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	45 กรัม
2	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2





4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- 3) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 4) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- 6) บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

1. นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2. เติมน้ำ 1,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก 30 นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
3. ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน
โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสีย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ





13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
2	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.

(10) มหาพิกัดตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดผง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัดตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดผง

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	45 กรัม
2	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2



**4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์**

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

7. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ดื่มขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ**13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์** ไม่พบ**13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ**

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
3	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.





14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.

(11) มหาพิกัฏฐ์ผลสำหรับกองวาทะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัฏฐ์ผลสำหรับกองวาทะสมุฏฐาน ชนิดแคปซูล
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	45 กรัม
2	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 80-100
- บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล



**6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ**

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

7. ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
3	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.



**(12) มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดต้ม**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาพิกัตตรีผลาสำหรับกองวาตะสมุฏฐาน ชนิดต้ม
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	45 กรัม
2	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	15 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 เล่ม 2
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
 - นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
 - บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
- ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 1,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก 30 นาที ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร





7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ต้มครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น โดยให้ต้มขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่ม

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
3	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552. หน้า 398.



**(13) ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดผง**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดผง
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะตูม	ผลอ่อน	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	Aegles Marmelotis Fructus	30 กรัม
2	ยอ	ผลอ่อน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Morindae Citrifoliae Fructus	30 กรัม
3	ลูกชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับลม และช่วยเพิ่มความอยากอาหาร

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะตูม	ผลอ่อน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.479-487.
2	ยอ	ผลอ่อน	ไม่พบ
3	ลูกชี่ลา	ผล	Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1986 Vol. I p.41-42.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาธเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(14) ตรีผลสมภูฐาน ชนิดแคปซูล**1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลสมภูฐาน ชนิดแคปซูล****2. สูตรตำรับ****2.1 ส่วนประกอบสำคัญ**

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะตูม	ผลอ่อน	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	Aegles Marmelotis Fructus	30 กรัม
2	ยอ	ผลอ่อน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Morindae Citrifoliae Fructus	30 กรัม





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
3	ลูกชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับลม และช่วยเพิ่มความอยากอาหาร

7. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า เย็น

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะตูม	ผลอ่อน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 479-487.





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
2	ยอ	ผลอ่อน	ไม่พบ
3	ลูกผักชีลา	ผล	Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1986 Vol. I p.41-42.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(15) ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดต้ม

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีผลสมุฏฐาน ชนิดต้ม
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	มะตูม	ผลอ่อน	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	Aegles Marmelotis Fructus	30 กรัม
2	ยอ	ผลอ่อน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Morindae Citrifoliae Fructus	30 กรัม
3	ลูกชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี





5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- 3) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 4) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- 6) บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ มีส่วนช่วยในการขับลม และช่วยเพิ่มความอยากอาหาร

7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

1. นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2. เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
3. ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ





13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะตูม	ผลอ่อน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 479-487.
2	ยอ	ผลอ่อน	ไม่พบ
3	ลูกชีลา	ผล	Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1986 Vol. I p.41-42.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาธเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(16) ตริกาลพิษ ชนิดผง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริกาลพิษ ชนิดผง
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	กระชาย	รากและ เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Radix et Rhizoma	30 กรัม
2	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	30 กรัม
3	กะเพรา	ราก	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Radix	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1





4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตร แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ และมีส่วนช่วยในการขับลม

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	กระชาย	รากและเหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
2	ข่า	เหง้า	Akhtar P, Ali M, Sharma MP, Farooqi H, Mir SR, Yusuf M, Khan HN. Development of quality standards of <i>Alpinia galanga</i> (Linn.) Willd. Rhizome. Current Botany. 2010 Dec 21.
3	กะเพรา	ราก	ไม่พบ





14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(17) ตริกาลพิษ ชนิดแคปซูล

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริกาลพิษ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	กระชาย	รากและ เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Radix et Rhizoma	30 กรัม
2	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	30 กรัม
3	กะเพรา	ราก	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Radix	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด





- 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยปรับสมดุลธาตุ และมีส่วนช่วยในการขับลม
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คำเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
13. การควบคุมคุณภาพ
13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ
13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	กระชาย	รากและเหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
2	ข่า	เหง้า	Akhtar P, Ali M, Sharma MP, Farooqi H, Mir SR, Yusuf M, Khan HN. Development of quality standards of <i>Alpinia galanga</i> (Linn.) Willd. Rhizome. Current Botany. 2010 Dec 21.
3	กะเพรา	ราก	ไม่พบ

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.





2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(18) ตรีกาลพิช ชนิดต้ม

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีกาลพิช ชนิดต้ม
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	กระชาย	รากและ เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Radix et Rhizoma	30 กรัม
2	ข่า	เหง้า	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Alpiniae Galangae Rhizoma	30 กรัม
3	กะเพรา	ราก	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Radix	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
 - นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
 - บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยปรับสมดุลธาตุ และมีส่วนช่วยในการขับลม





7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ต้มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	กระชาย	รากและเหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
2	ข่า	เหง้า	Akhtar P, Ali M, Sharma MP, Farooqi H, Mir SR, Yusuf M, Khan HN. Development of quality standards of <i>Alpinia galanga</i> (Linn.) Willd. Rhizome. Current Botany. 2010 Dec 21.
3	กะเพรา	ราก	ไม่พบ

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป





15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(19) ตำรับสมุนไพรรุ่งร่างกาย สูตร 1 ชนิดลูกกลอน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรรุ่งร่างกาย สูตร 1 ชนิดลูกกลอน
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 180 กรัม
1	ทังถ่อน	เปลือกต้น	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	<i>Albiziae Procerae</i> Cortex	15 กรัม
2	ตะโกนา	เปลือกต้น	<i>Diospyros rhodocalyx</i> Kurz	<i>Diospyrotis</i> Rhodocalycis Cortex	15 กรัม
3	บอระเพ็ด	เถา	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	<i>Tinosporae Crispae</i> Caulis	15 กรัม
4	ข่อย	เมล็ด	<i>Streblus asper</i> Lour.	<i>Strebli Asperis Semen</i>	15 กรัม
5	แห้วหมู	หัวใต้ดิน	<i>Cyperus rotundus</i> L.	<i>Cyperi Rotundi Cormus</i>	15 กรัม
6	พริกไทยดำ	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Fructus</i>	15 กรัม
7	น้ำผึ้ง	-	-	-	90 กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ 4 แล้ว

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรรุ่งร่างกาย

- 1) ตำรายาพิเศษ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 3

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

การเคี่ยวน้ำผึ้ง: นำน้ำผึ้งเคี่ยวด้วยไฟแรง จนเดือดเป็นฟองใหญ่ เคี่ยวนจนกระทั่งฟองมีขนาดเล็ก และละเอียด กลางจากเตา ได้น้ำผึ้งสีน้ำตาลเข้มขึ้น



**5. กรรมวิธีการผลิต**

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ 80-100
- 5) นำผงยาในข้อ 4 มาผสมกับน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้วให้เข้ากัน แล้วปั้นเป็นเม็ดลูกกลอน
- 6) นำยาลูกกลอนที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยบำรุงร่างกาย

7. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 800 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
- 2) ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
- 3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ทังอ่อน	เปลือกต้น	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.752-758.
2	ตะโกนา	เปลือกต้น	ไม่พบ
3	บอระเพ็ด	เถา	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.11-20.
4	ข่อย	เมล็ด	ไม่พบ
5	แห้วหมู	หัวใต้ดิน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
6	พริกไทยดำ	ผลแก่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.589-597.
7	น้ำผึ้ง	-	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง น้ำผึ้ง





14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. สุรสีห์วิสิษฐศักดิ์, เจ้าพระยา. ตำรายาพิเศษ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร; 2462. หน้า 4
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรมการพิมพ์; 2504. หน้า 263
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: รายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2564. หน้า 63

(20) ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 2 ชนิดลูกกลอน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 2 ชนิดลูกกลอน
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 2,000 กรัม
1	มะตูมนิม	ผล	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corrêa	<i>Aegles Marmelotis</i> Fructus	500 กรัม
2	กล้วยน้ำไท	ผลสุก	<i>Musa</i> (AA) “Kluai Nam Thai”	<i>Musae Fructus</i>	500 กรัม
3	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	<i>Piperis Nigri Fructus</i>	500 กรัม
4	น้ำผึ้ง	-	-	-	500 กรัม*

* น้ำหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ 4 แล้ว

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำรายาพิเศษ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
- 2) ตำราอายุรเวทศึกษา เล่ม 2

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

การเคี่ยวน้ำผึ้ง: นำน้ำผึ้งเคี่ยวด้วยไฟแรง จนเดือดเป็นฟองใหญ่ เคี่ยวจนกระทั่งฟองมีขนาดเล็ก และละเอียด ยกลงจากเตา ได้น้ำผึ้งสีน้ำตาลเข้มขึ้น



**5. กรรมวิธีการผลิต**

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม โดยมะตูมนิ่มและกล้วยน้ำไท ใช้เฉพาะส่วนเนื้อผล
- 2) อบพริกไทยล่อนที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) นำพริกไทยล่อนจากข้อ 2 บดละเอียด และนำไปผ่านร่อนเบอร์ 80
- 4) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5) นำเนื้อผลมะตูมนิ่ม (สด) เนื้อผลกล้วยน้ำไท (สด) พริกไทยล่อน และน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้ว 450 กรัม มาบดผสมรวมกัน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- 6) นำส่วนผสมในข้อ 5 นึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา 10 นาที
- 7) นำส่วนผสมในข้อ 6 มาขนาดผสมกับน้ำผึ้งที่เคี่ยวแล้ว 50 กรัม จนสม่ำเสมอ ตั้งทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง
- 8) นำส่วนผสมที่ได้ในข้อ 7 มาปั้นเป็นเม็ดลูกกลอน
- 9) นำเม็ดลูกกลอนที่ได้ ไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ช่วยบำรุงร่างกาย

7. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 900 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
- 2) ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
- 3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะตูมนิ่ม	ผล	ไม่พบ
2	กล้วยน้ำไท	ผลสุก	ไม่พบ





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
3	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.598.
4	น้ำผึ้ง	-	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง น้ำผึ้ง

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

14.1 ปริมาณของพริกไทย ในยาตำรับนี้เท่ากับปริมาณของผลมะตูม نیم 1 ผล และผลกล้วยน้ำไท 1 ทวี

14.2 ตำรับนี้โบราณระบุให้ “ทำเป็นแผ่นตากแดดให้แห้งแล้วลงครกป่นให้แหลกละเอียดเอาผสมกับน้ำผึ้ง”
แต่อาจทำเป็นรูปแบบยาลูกกลอนได้ เพื่อให้สะดวกในการกินและเก็บไว้ได้นาน

เอกสารอ้างอิง

1. สุรสีห์วิสิษฐศักดิ์, เจ้าพระยา. ตำรายาพิเศษ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร; 2462. หน้า 22
2. นิเทศสุขกิจ, ขุน (ถนอมรัตน์ พุ่มชูศรี). อายุรเวชศึกษา เล่ม 2. กรุงเทพฯ : พร้อมจักรการพิมพ์; 2516.
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: รายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2564. หน้า 410-411

(21) ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 3 ชนิดผง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำรับสมุนไพรบำรุงร่างกาย สูตร 3 ชนิดผง

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 3,000 กรัม
1	กระชาย	รากและ เหง้า	<i>Boesenbergia rotunda</i> (L.) Mansf.	Boesenbergiae Rotundae Radix et Rhizoma	500 กรัม
2	แห้วหมู	หัวใต้ดิน	<i>Cyperus rotundus</i> L.	Cyperi Rotundi Cormus	500 กรัม
3	บัวบก	หัว	<i>Stephania erecta</i> Craib	Stephaniae Erectae Radix	500 กรัม
4	พริกไทยล่อน	เมล็ดจาก ผลสุก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	1,500 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี





3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) นำกระชายและแห้วหมูไปต้มในน้ำสะอาด จนสุกดี
 - 3) อบกระชาย แห้วหมู และห้วบัวบก อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 4) อบพริกไทยอ่อนที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 5) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 6) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
 - 7) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยบำรุงร่างกาย
7. ขนาดและวิธีใช้
ครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อน 50-100 มิลลิลิตร ผสมน้ำผึ้ง 1 ช้อนชา ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
9. คำเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
 - 1) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
 - 2) ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่มและยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
 - 3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
13. การควบคุมคุณภาพ
 - 13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ
 - 13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	กระชาย	รากและเหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
2	แห้วหมู	หัวใต้ดิน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
3	บัวบก	หัว	ไม่พบ
4	พริกไทยล่อน	เมล็ดจากผลสุก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.598.
5	น้ำผึ้ง	-	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง น้ำผึ้ง

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 173.

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยระบบทางเดินอาหาร

(1) ตรีภูก ขนิดผง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีภูก ขนิดผง

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	30 กรัม
2	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	30 กรัม
3	ตีปลี	ข้อผลที่โต เต็มที่	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1



**4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์**

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด และมีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในฤดูร้อน เพราะอาจส่งผลให้ไฟธาตุกำเริบ
- 2) ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- 3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีพริกไทยและดีปตีในปริมาณสูง
- 4) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ และผู้มีความดันโลหิตสูง
- 5) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	พริกไทย	ผลแก่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 589-579.
2	ขิง	เหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 210-217.





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
3	ดีปลี	ข้อผลที่โตเต็มที่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 111-120.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 54.

(2) ตรีภูก ขนิดแคปซูล

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีภูก ขนิดแคปซูล

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	30 กรัม
2	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	30 กรัม
3	ดีปลี	ข้อผลที่โตเต็มที่	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง





- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล
 6. **ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ**
มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด และมีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย
 7. **ขนาดและวิธีใช้**
กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น
 8. **ข้อห้ามใช้**
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
 9. **คำเตือน**
ไม่มี
 10. **ข้อควรระวัง**
 - 1) ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในฤดูร้อน เพราะอาจส่งผลให้ไฟธาตุกำเริบ
 - 2) ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
 - 3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีพริกไทยและดีป्लीในปริมาณสูง
 - 4) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ และผู้มีความดันโลหิตสูง
 - 5) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย
 11. **อาการไม่พึงประสงค์**
ยังไม่มีรายงาน
 12. **การเก็บรักษา**
เก็บในที่แห้ง
 13. **การควบคุมคุณภาพ**
 - 13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ
 - 13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
- | ลำดับ | ชื่อไทย | ส่วนที่ใช้ | การควบคุมคุณภาพ |
|-------|---------|-------------------|--|
| 1 | พริกไทย | ผลแก่ | Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 589-579. |
| 2 | ขิง | เหง้า | Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 210-217. |
| 3 | ดีป्ली | ข้อผลที่โตเต็มที่ | Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 111-120. |
14. **ประเภทผลิตภัณฑ์** (ช่องทางการจำหน่าย)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
 15. **ข้อมูลเพิ่มเติม**
ไม่มี





เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 54.

(3) ตรีภูก ขนิดต้ม

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีภูก ขนิดต้ม

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	พริกไทย	ผลแก่	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Fructus	30 กรัม
2	ขิง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma	30 กรัม
3	ดีปลี	ช่อผลที่โตเต็มที่	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- 3) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 4) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- 6) บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด และมีส่วนช่วยลดอาการที่เกิดจากสภาวะอาหารไม่ย่อย





7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

1. นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2. เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
3. ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ต้มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในฤดูร้อน เพราะอาจส่งผลให้ไฟธาตุกำเริบ
- 2) ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- 3) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีพริกไทยและตีป्लीในปริมาณสูง
- 4) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ และผู้มีความดันโลหิตสูง
- 5) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	พริกไทย	ผลแก่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 589-579.
2	ขิง	เหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 210-217.
3	ตีป्ली	ข้อผลที่โตเต็มที่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 111-120.





14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 54.

(4) ตรีสันนิบาตผล ชนิดผง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสันนิบาตผล ชนิดผง
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	พริกไทย	ราก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Radix	30 กรัม
2	ดีปลี	ช่อดอกที่โตเต็มที	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	30 กรัม
3	กะเพรา	ราก	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Radix	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ 100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์



**6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ**

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า ยืน ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- 2) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีตีป्लीในปริมาณสูง
- 3) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ และผู้มีความดันโลหิตสูง
- 4) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ**13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์** ไม่พบ**13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ**

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	พริกไทย	ราก	ไม่พบ
2	ตีป्ली	ข้อผลที่โตเต็มที่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 111-120.
3	กะเพรา	ราก	ไม่พบ

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.





2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.

(5) ตรีสันนิบาตผล ชนิดแคปซูล

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสันนิบาตผล ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	พริกไทย	ราก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Radix	30 กรัม
2	ดีปลี	ช่อดอกที่โตเต็มที่แล้ว	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	30 กรัม
3	กะเพรา	ราก	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Radix	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - 1) ตำรายาแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก



**9. คำเตือน**

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- 2) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีตีป्लीในปริมาณสูง
- 3) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ และผู้มีความดันโลหิตสูง
- 4) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	พริกไทย	ราก	ไม่พบ
2	ตีป्ली	ข้อผลที่โตเต็มที่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 111-120.
3	กะเพรา	ราก	ไม่พบ

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.



**(6) ตรีสันนิบาตผล ชนิดต้ม**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสันนิบาตผล ชนิดต้ม
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	พริกไทย	ราก	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperis Nigri Radix	30 กรัม
2	ดีปลี	ข้อผลที่โต เต็มที่	<i>Piper retrofractum</i> Vahl	Piperis Retrofracti Fructus	30 กรัม
3	กะเพรา	ราก	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	Ocimi Tenuiflori Radix	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
 - นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
 - บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด
- ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร





7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ต้มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน
 โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- 2) ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีตีป्लीในปริมาณสูง
- 3) ควรระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุ และผู้มีความดันโลหิตสูง
- 4) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	พริกไทย	ราก	ไม่พบ
2	ตีป्ली	ข้อผลที่โตเต็มที่	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p. 111-120.
3	กะเพรา	ราก	ไม่พบ

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.



**(7) ตริพิษจักร ชนิดผง**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริพิษจักร ชนิดผง
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	30 กรัม
2	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Syzygii Aromatici Flos หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Caryophylli Flos	30 กรัม
3	ลูกชีล่อม	ผล	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson	Cnidii Monnieri Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร่อนผ่านร่อนเบอร์ 100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลม

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี





9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ลูกจันทน์	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.386-394.
2	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
3	ลูกขี้ล้อม	ผล	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัล จำกัด; 2551. หน้า 275-278.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494-495.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.



**(8) ตริพิษจักร ชนิดแคปซูล**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริพิษจักร ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	30 กรัม
2	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Syzygii Aromatici Flos หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Caryophylli Flos	30 กรัม
3	ลูกขี้ล้อม	ผล	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson	Cnidii Monnieri Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณะ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลม

7. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ลูกจันทน์	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.386-394.
2	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
3	ลูกขี้ล่อม	ผล	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัลส์ จำกัด; 2551. หน้า 275-278.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494-495.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.



**(9) ตริพิษจักร ชนิดต้ม**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริพิษจักร ชนิดต้ม
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	30 กรัม
2	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Syzygii Aromatici Flos หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Caryophylli Flos	30 กรัม
3	ลูกชีล่อม	ผล	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson	Cnidii Monnieri Fructus	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1.) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2.) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- 3.) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 4.) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5.) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- 6.) บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลม





7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ต้มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่ น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ลูกจันทน์	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.386-394.
2	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022
3	ลูกซีล่อม	ผล	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักขณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัล จำกัด; 2551. หน้า 275-278.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี



**เอกสารอ้างอิง**

1. พิศณุประสาททเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494-495.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.

(10) ตรีสมอ ชนิดผง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสมอ ชนิดผง
2. สูตรตำรับ
 - 2.1. ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอเทศ	ผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Fructus Importa	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับถ่าย



**7. ขนาดและวิธีใช้**

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า ยืน
ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-651.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	สมอเทศ	ผล	Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2 nd 2016 p.60-61.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

พิศณุประสาทเวช, พระยา. เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พาณิชย์เจริญ วงเวียนใหญ่; พ.ศ.
2496. หน้า 34.



**(11) ตรีสมอ ชนิดแคปซูล**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสมอ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1. ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอเทศ	ผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Fructus Importa	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คำเตือน
ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

- 1) ควรระวังในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-651.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	สมอเทศ	ผล	Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2 nd 2016 p.60-61.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

พิศณุประสาทเวช, พระยา. เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พาณิชย์เจริญ วงเวียนใหญ่; พ.ศ. 2496. หน้า 34.

(12) ตรีสมอ ชนิดต้ม**1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสมอ ชนิดต้ม****2. สูตรตำรับ****2.1 ส่วนประกอบสำคัญ**

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	สมอเทศ	ผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Fructus Importa	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ตำราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- 3) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 4) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- 6) บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

1. นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2. เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
3. ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน
โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี



**9. คำเตือน**

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-651.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	สมอเทศ	ผล	Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2 nd 2016 p.60-61.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

พิศณุประสาทเวช, พระยา. เวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พาณิชย์เจริญ วงเวียนใหญ่; พ.ศ. 2496. หน้า 34.



**(13) ตรีสัตตกุลา ชนิดผง**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสัตตกุลา ชนิดผง
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Zingiberis Rhizoma Preparata	30 กรัม
2	ลูกชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	30 กรัม
3	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร้อนผ่านแร้งเบอร์ 100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด
7. ขนาดและวิธีใช้
ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
ขณะยังอุ่นอยู่



**8. ข้อห้ามใช้**

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ขิงแห้ง	เหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.210-217.
2	ลูกชี่ลา	ผล	Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1986 Vol. I p.41-42.
3	เทียนดำ	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.688-694.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.



**(14) ตรีสัตตกุลา ชนิดแคปซูล**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสัตตกุลา ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Zingiberis Rhizoma Preparata	30 กรัม
2	ลูกชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	30 กรัม
3	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - 1) ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมาผสมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
 - 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล
6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี





9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ขิงแห้ง	เหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.210-217.
2	ลูกขี้ลา	ผล	Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1986 Vol. I p.41-42.
3	เทียนดำ	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.688-694.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.

(15) ตรีสัตตกุลา ชนิดต้ม

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีสัตตกุลา ชนิดต้ม

2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนักรวม 90 กรัม

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
1	ขิงแห้ง	เหง้า	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberis Officinalis Rhizoma Preparata หรืออีกชื่อหนึ่งว่า	30 กรัม





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก
				Zingiberis Rhizoma Preparata	
2	ลูกชีลา	ผล	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandri Sativi Fructus	30 กรัม
3	เทียนดำ	เมล็ด	<i>Nigella sativa</i> L.	Nigellae Sativae Semen	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- บรรจุห่อสมุนไพรลงในซองอะลูมิเนียมฟอยล์หรือซองที่กันความชื้นได้

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด

7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน
 โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง



**8. ข้อห้ามใช้**

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	ชิงแห้ง	เหง้า	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.210-217.
2	ลูกขี้ลา	ผล	Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1986 Vol. I p.41-42.
3	เทียนดำ	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.688-694.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 494.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 33.



**(16) ตริคันธวาท ชนิดผง**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริคันธวาท ชนิดผง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	เร่วใหญ่	เมล็ด	<i>Alpinia speciosa</i> K. Schum.	Alpiniae Speciosae Semen	30 กรัม
2	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	30 กรัม
3	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Syzygii Aromatici Flos หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Caryophylli Flos	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
- บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี





9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	เร่วใหญ่	เมล็ด	ไม่พบ
2	ลูกจันทน์	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.386-394.
3	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.



**(17) ตริคันธวาท ชนิดแคปซูล**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตริคันธวาท ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	เร่วใหญ่	เมล็ด	<i>Alpinia speciosa</i> K. Schum.	Alpiniae Speciosae Semen	30 กรัม
2	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	30 กรัม
3	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Syzygii Aromatici Flos หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Caryophylli Flos	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด

7. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี



**10. ข้อควรระวัง**

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	เร่วใหญ่	เมล็ด	ไม่พบ
2	ลูกจันทน์	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.386-394.
3	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

(18) ตรีคันทวารัต ชนิดต้ม**1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตรีคันทวารัต ชนิดต้ม****2. สูตรตำรับ****2.1 ส่วนประกอบสำคัญ**

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
1	เร่วใหญ่	เมล็ด	<i>Alpinia speciosa</i> K. Schum.	Alpiniae Speciosae Semen	30 กรัม
2	ลูกจันทน์	เมล็ด	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicae Fragrantis Semen	30 กรัม





ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 90 กรัม
3	กานพลู	ดอกตูม ก่อนบาน	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Syzygii Aromatici Flos หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Caryophylli Flos	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
- คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณะ เล่ม 2

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุง

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับลมและลดอาการท้องอืด

7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

- นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
- เติมน้ำ 2,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟแรง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ จนเหลือปริมาตรประมาณ 1,000 มิลลิลิตร (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ยกออกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
- ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน
โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี





9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	เร่วใหญ่	เมล็ด	ไม่พบ
2	ลูกจันทน์	เมล็ด	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.386-394.
3	กานพลู	ดอกตูมก่อนบาน	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 Supplement 2022

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

- พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
- โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.



**(19) จตุผลาธิกะ ชนิดผง**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จตุผลาธิกะ ชนิดผง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 120 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม
4	สมอเทศ	ผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Fructus Importa	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 - ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1
 - คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
 - ร่อนผ่านแร้งเบอร์ 100
 - บรรจุผงสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในการขับถ่าย



**7. ขนาดและวิธีใช้**

ครั้งละ 1.5 กรัม ชงน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า ยืน
ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
4	สมอเทศ	ผล	Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2 nd 2016 p. 60-61.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาธเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพาน
ยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.



**(20) จตุผลาธิกะ ชนิดแคปซูล**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จตุผลาธิกะ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 120 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม
4	สมอเทศ	ผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Fructus Importa	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
- 4) ร้อนผ่านแรงเบอร์ 80-100
- 5) บรรจุผงสมุนไพรลงแคปซูล

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

7. ขนาดและวิธีใช้

กินครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เข้า เย็น



**8. ข้อห้ามใช้**

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
4	สมอเทศ	ผล	Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2 nd 2016 p. 60-61.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ชุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.



**(21) จตุผลาธิกะ ชนิดต้ม**

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จตุผลาธิกะ ชนิดต้ม
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 120 กรัม
1	สมอไทย	เนื้อผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Pericarpium	30 กรัม
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Terminaliae Belliricae Pericarpium	30 กรัม
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	Phyllanthi Emblicae Pericarpium	30 กรัม
4	สมอเทศ	ผล	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	Terminaliae Chebulae Fructus Importa	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร

- 1) ตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
- 2) คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1

4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์

ไม่มี

5. กรรมวิธีการผลิต

- 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
- 2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลงและมีขนาดสม่ำเสมอ
- 3) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
- 4) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ
- 5) นำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมรวมกัน แล้วบรรจุในห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม
- 6) บรรจุห่อสมุนไพรลงในบรรจุภัณฑ์

6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ

มีส่วนช่วยในการขับถ่าย





7. ขนาดและวิธีใช้

7.1 วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับต้ม

1. นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้ม ที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2. เติมน้ำ 1,000 มิลลิลิตร นำไปตั้งบนเตา ต้มจนเดือดด้วยไฟกลาง แล้วลดอุณหภูมิลงโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ต้มต่อไปอีก 30 นาที ยกจากเตา นำห่อผ้าขาวบางหรือซองเยื่อกระดาษสำหรับต้มออก
3. ปรับปริมาตรด้วยน้ำต้มสุก จนครบ 1,000 มิลลิลิตร

7.2 วิธีใช้

รินเอาน้ำ ครั้งละ 50-100 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
น้ำที่ต้มแล้ว เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (แช่ไว้ในตู้เย็น) ได้ 5 วัน
 โดยต้องอุ่นก่อนดื่มทุกครั้ง

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

- 1) ควรระวังการใช้ในผู้ที่ท้องเสียง่าย
- 2) หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย

11. อาการไม่พึงประสงค์

ท้องเสีย

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	สมอไทย	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอไทยใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.643-652.
2	สมอพิเภก	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของสมอพิเภกใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.634-642.
3	มะขามป้อม	เนื้อผล	เทียบเคียงกับมอโนกราฟของมะขามป้อมใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.426-433.
4	สมอเทศ	ผล	Taiwan Herbal Pharmacopoeia 2 nd 2016 p. 60-61.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป





15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

1. พิศณุประสาทเวช, พระยา. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทย สะพานยศเส; ร.ศ. 128. หน้า 493.
2. โสภิตบรรณลักษณ์, ขุน (อำพัน กิตติขจร). คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุตสาหกรรม การพิมพ์; 2504. หน้า 32.

3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส

(1) เกสรทั้ง 5 ชนิดขง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกสรทั้ง 5 ชนิดขง
2. สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 150 กรัม
1	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	<i>Jasmini Sambaci Flos</i>	30 กรัม
2	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	<i>Mimusopsis Elengi Flos</i>	30 กรัม
3	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	<i>Mesuae Ferreae Flos</i>	30 กรัม
4	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> (Miq.) T. Anderson	<i>Mammeae Siamensis Flos</i>	30 กรัม
5	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	<i>Nelumbinis Stamen</i>	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

3. ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราประมวลหลักเภสัช
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
 - 1) นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - 2) อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง





- 3) ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดหยาบ
- 4) บรรจุผงสมุนไพรในซองเยื่อกระดาษ
6. **ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ**
ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส
7. **ขนาดและวิธีใช้**
ครั้งละ 1.5 กรัม แช่น้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2-3 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-(กลางวัน)-เย็น ขณะยังอุ่นอยู่
8. **ข้อห้ามใช้**
ไม่มี
9. **คำเตือน**
ไม่มี
10. **ข้อควรระวัง**
ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
11. **อาการไม่พึงประสงค์**
ยังไม่มีรายงาน
12. **การเก็บรักษา**
เก็บในที่แห้ง
13. **การควบคุมคุณภาพ**
13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ
13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะลิ	ดอก	Standard of ASEAN Herbal Medicine 1993 Vol.I p.270- 281.
2	พิกุล	ดอก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.551-559.
3	สารภี	ดอก	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัลส์ จำกัด; 2551. หน้า 341-344.
4	บุณฑริก	ดอก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.42-50.
5	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.21-28.

14. **ประเภทผลิตภัณฑ์** (ช่องทางการจำหน่าย)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป
15. **ข้อมูลเพิ่มเติม**
ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. ตำราประมวลหลักเภสัช. นำอักษร การพิมพ์, 2528. หน้า 142.



**(2) เกสรทั้ง 7 ชนิดขง**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกสรทั้ง 7 ชนิดขง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 120 กรัม
1	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	30 กรัม
2	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	30 กรัม
3	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	30 กรัม
4	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> (Miq.) T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	30 กรัม
5	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	30 กรัม
6	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	30 กรัม
7	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson	Canangae Odoratae Flos	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราประมวลหลักเภสัช
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดหยาบ
 - บรรจุผงสมุนไพรในซองเยื่อกระดาษ
- ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส



**7. ขนาดและวิธีใช้**

ครั้งละ 1.5 กรัม แช่ในน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2-3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า-(กลางวัน)-เย็น ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะลิ	ดอก	Standard of ASEAN Herbal Medicine 1993 Vol.I p.270- 281.
2	พิทูล	ดอก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.551-559.
3	สารภี	ดอก	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจาก งานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัลส์ จำกัด; 2551. หน้า 341-344.
4	บุณฑริก	ดอก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.42-50.
5	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.21-28.
6	จำปา	ดอก	ไม่พบ
7	กระดังงา	ดอก	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ์ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทยจาก งานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัลส์ จำกัด; 2551. หน้า 33-36.

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป

15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

เอกสารอ้างอิง

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. ตำราประมวลหลักเภสัช. นำอักษรการพิมพ์, 2528. หน้า 142-143.



**(3) เกสรทั้ง 9 ชนิดขง**

- ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกสรทั้ง 9 ชนิดขง
- สูตรตำรับ

2.1 ส่วนประกอบสำคัญ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อละติน	น้ำหนัก 270 กรัม
1	มะลิ	ดอก	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Aiton	Jasmini Sambaci Flos	30 กรัม
2	พิกุล	ดอก	<i>Mimusops elengi</i> L.	Mimusopsis Elengi Flos	30 กรัม
3	บุนนาค	ดอก	<i>Mesua ferrea</i> L.	Mesuae Ferreae Flos	30 กรัม
4	สารภี	ดอก	<i>Mammea siamensis</i> (Miq.) T. Anderson	Mammeae Siamensis Flos	30 กรัม
5	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	Nelumbinis Stamen	30 กรัม
6	จำปา	ดอก	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	Magnoliae Champacae Flos	30 กรัม
7	กระดังงา	ดอก	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. & Thomson	Canangae Odoratae Flos	30 กรัม
8	ลำเจียก	ดอก	<i>Pandanus odorifer</i> (Forssk.) Kuntze	Pandani odoriferis Flos	30 กรัม
9	ลำดวน	ดอก	<i>Melodorum</i> <i>fruticosum</i> Lour.	Melodori fruticosi Flos	30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ

ไม่มี

- ที่มาของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำราประมวลหลักเภสัช
- วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้เตรียมผลิตภัณฑ์
ไม่มี
- กรรมวิธีการผลิต
 - นำสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ มาทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 - อบที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
 - ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบตามสูตรตำรับ แล้วนำมารวมกัน จากนั้นบดหยาบ
 - บรรจุผงสมุนไพรในซองเยื่อกระดาษ



**6. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ**

ช่วยทำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส

7. ขนาดและวิธีใช้

ครั้งละ 1.5 กรัม แช่ในน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ดื่มวันละ 2-3 ครั้ง หลังอาหาร เข้า-(กลางวัน)-เย็น ขณะยังอุ่นอยู่

8. ข้อห้ามใช้

ไม่มี

9. คำเตือน

ไม่มี

10. ข้อควรระวัง

ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

11. อาการไม่พึงประสงค์

ยังไม่มีรายงาน

12. การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง

13. การควบคุมคุณภาพ

13.1 การควบคุมคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์ ไม่พบ

13.2 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

ลำดับ	ชื่อไทย	ส่วนที่ใช้	การควบคุมคุณภาพ
1	มะลิ	ดอก	Standard of ASEAN Herbal Medicine 1993 Vol.I p.270- 281.
2	พิกุล	ดอก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.551-559.
3	สารภี	ดอก	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัล จำกัด; 2551. หน้า 341-344.
4	บุณฑริก	ดอก	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.42-50.
5	บัวหลวง	เกสรเพศผู้	Thai Herbal Pharmacopoeia 2021 p.21-28.
6	จำปา	ดอก	ไม่พบ
7	กระดังงา	ดอก	นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, นางลักษณ เรืองวิเศษ. คุณภาพเครื่องยาไทย จากงานวิจัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ:บริษัท คอนเซ็ปท์ เมดิคัล จำกัด; 2551. หน้า 33-36.
8	ลำเจียก	ดอก	ไม่พบ
9	ลำดวน	ดอก	ไม่พบ

14. ประเภทผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการจำหน่าย)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายทั่วไป





15. ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี

16. เอกสารอ้างอิง

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. ตำราประมวลหลักเภสัช. นำอักษร
การพิมพ์, 2528. หน้า 143.

.....



รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ
และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง



คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ ๒๓๗๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงเพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียน
ตำรับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

โดยเป็นการสมควรให้ปรับปรุงคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๖๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายการมาตรฐาน ประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีกรรมการ โอนย้ายหน่วยงานและให้ชื่อคณะกรรมการแต่ละชุดสอดคล้องกับภารกิจตามหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้ออกคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงเพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|-----------|
| ๑) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ที่ปรึกษา |
| ๒) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา | ที่ปรึกษา |
| ๓) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได้รับมอบหมาย | ประธาน |
| ๔) ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ราชบัณฑิต | รองประธาน |
| ๕) ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | กรรมการ |
| ๖) นายกสมาคมอาหารเสริมสุขภาพ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๗) นายกสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๘) นางสาวอัญชลี จุฑะพุทธิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม | กรรมการ |
| ๙) นายชาติรี เจตน์ธรรมจักร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | กรรมการ |
| ๑๐) นางลัดดาวัลย์ ทรัพย์ปัญญา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | กรรมการ |

๑๑) นางเนตรดาว...

- ๑๑)นางเนตรดาว ยวงศรี กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย
- ๑๒)นายยุทธเดช เวชพงศา กรรมการ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- ๑๓)ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรรมการ
กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเลขานุการ
- ๑๔) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรรมการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๑๕) นางจิรารัตน์ เพิ่มภูศรี กรรมการ
เภสัชกรชำนาญการ และผู้ช่วยเลขานุการ
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑.๒ หน้าที่และอำนาจ

๑) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงของตำรับยาแผนไทยและข้อบ่งใช้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๒) ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลรายการอ้างอิงของตำรับยาแผนไทยและข้อบ่งใช้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓) พิจารณาความถูกต้องของข้อมูลรายการอ้างอิงของตำรับยาแผนไทยและข้อบ่งใช้ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบหมาย

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงเพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทย โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

- ๑) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ปรึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย
- ๒) ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษา
กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๓) ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ๔) ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร ประธาน
ราชบัณฑิต

๕) ผู้อำนวยการ...

- ๑๙) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร กรรมการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย และเลขานุการ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๒๐) นางสาวพิศพรรณ วีระยิ่งยง กรรมการ
เภสัชกรชำนาญการ และเลขานุการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๒๑) นางสาวชวิศา ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ กรรมการ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๒๒) นางสาวภัทธีรา แรงกล้า กรรมการ
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๒๓) นางสาวกรรวิ กรวิศิษฐ์วาทีน กรรมการ
แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ๒๔) นางสาวรุ่งทิพย์ เลาะวิถี กรรมการ
แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยเลขานุการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

- ๑) รวบรวมข้อมูลตำรับยาแผนไทย เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลรายการอ้างอิงของตำรับยาแผนไทยและข้อบ่งใช้ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทย
- ๒) เสนอข้อมูลรายการอ้างอิงของตำรับยาแผนไทยและข้อบ่งใช้ ประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทย ต่อคณะกรรมการอำนาจการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงเพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
- ๓) สนับสนุนวิชาการในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงของตำรับยาแผนไทยและข้อบ่งใช้ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทย
- ๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบหมาย

ข้อ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงเพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๓.๑ องค์ประกอบ

- ๑) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ปรึกษา
ที่ได้รับมอบหมาย

๒) ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|-----------|
| ๒) ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ที่ปรึกษา |
| ๓) ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ที่ปรึกษา |
| ๔) ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร
ราชบัณฑิต | ประธาน |
| ๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร หรือผู้แทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด หรือผู้แทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | กรรมการ |
| ๗) รองศาสตราจารย์อรุณพร อธิรัตน์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๘) รองศาสตราจารย์ชนิพรรณ บุตรยี่
สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล | กรรมการ |
| ๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา ศรียากุล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๐) นายปิยะพล พูลสุข
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรรมการ |
| ๑๑) นางปราณี ขวลิตธำรง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม | กรรมการ |
| ๑๒) นางสาวอัญชลี จุฑะพุทธิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม | กรรมการ |
| ๑๓) นางสาวเพ็ญศรี สงวนทรัพย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย | กรรมการ |
| ๑๔) นางวันทนี เจตนธรรมจักร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | กรรมการ |
| ๑๕) นางสาวนิมณฑล เลาสุขไพศาล
เภสัชกรชำนาญการ
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | กรรมการ |

๑๖) นางจิรารัตน์...

- ๑๖) นางจิรารัตน์ เพิ่มภูศรี
เภสัชกรชำนาญการ
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรรมการ
- ๑๗) นายจักรกฤษณ์ สิงห์บุตร
เภสัชกรชำนาญการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
- ๑๘) หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
และเลขานุการ
- ๑๙) นางสาวพิศพรรณ วีระยิ่งยง
เภสัชกรชำนาญการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
และเลขานุการ
- ๒๐) นางสาวชวีศา ประดิษฐ์อุกฤษฏ์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
- ๒๑) นางสาวภัทธีรา แรงกล้า
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
- ๒๒) นางสาวกรรวิ กรวิศิษฐ์วาทีน
แพทย์แผนไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
- ๒๓) นางสาวรุ่งทิพย์ เลาะวิถึ
แพทย์แผนไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒ หน้าที่และอำนาจ

๑) รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูล
รายการอ้างอิงของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อประกอบการอนุญาต
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๒) เสนอข้อมูล...

๒) เสนอข้อมูลรายการอ้างอิงของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงเพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนตำรับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๓) สนับสนุนวิชาการในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อมูลรายการอ้างอิงของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพื่อประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบหมาย

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๖๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายการมาตรฐานประกอบการอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก